

оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,4ц/га, Полісся - 86,2ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,0 -7,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,6- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-80 %. Вміст крохмалю 73,4 - 74,1%, білку 8,0 - 8,7 %.

### **04004008 ЛГ 3409**

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Положення листової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Розміщення колосків на волоті - щільне. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - наявне.

Урожайність по зоні Степу 67,7 ц/га, Лісостепу - 92,1ц/га, Полісся - 87,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,3 - 6,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,6- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-80 %. Вміст крохмалю 73,8 - 74,8%, білку 7,7 - 9,3 %.

### **04004085 Лелека МВ**

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,5ц/га, Полісся - 91,5ц/га, гарантована прибавка відповідно 442 - 10,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,2- 8,4 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-79 %. Вміст крохмалю 73,9 - 76,0%, білку 9,0 - 9,6 %.

### **04004112 ЛГ 2447**

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки