

## **05004007 НС 2012**

**Заявник:** Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочек на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу -84,0 ц/га, Полісся - 89,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,3 - 6,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,8 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 75,2 - 76,6%, білку 9,2 - 9,4 %.

## **04004018 ПР39Ф58**

**Заявник:** Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

**Власник(и):** Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

**Підтримувач(и):** Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Положення листкової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочек на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек на волоті - середня, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки зернини - жовтий.

Урожайність по зоні Степу становить 72,8 ц/га, Лісостепу - 91,6 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,9 - 8,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-83 %. Вміст крохмалю 75,9- 76,6%, білку 9,0- 9,4 %.

## **04004020 ПР39Т45**

**Заявник:** Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

**Власник(и):** Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

**Підтримувач(и):** Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Положення листкової пластинки листка у просторі - пряме. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочек на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек на волоті - відсутня або дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формуєю конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки та низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.