

## 05004007 НС 2012

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу -84,0 ц/га, Полісся - 89,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,3 - 6,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,8 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 75,2 - 76,6%, білку 9,2 - 9,4 %.

## 04004018 ПР39Ф58

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(і): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Положення листової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - середня, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки зернини - жовтий.

Урожайність по зоні Степу становить 72,8ц/га, Лісостепу -91,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,9 - 8,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-83 %. Вміст крохмалю 75,9- 76,6%, білку 9,0- 9,4 %.

## 04004020 ПР39Т45

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(і): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Положення листової пластинки листка у просторі - пряме. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - відсутня або дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки та низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.



Урожайність по зоні Степу становить 78,5ц/га, Лісостепу - 96,7ц/га, Полісся - 97,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 11,0 - 14,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-82 %. Вміст крохмалю 74,7- 76,1%, білку 8,6 - 9,3 %.

### ® 04004055 Подільський 274 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення шовку - слабе. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 72,4ц/га, Лісостепу - 99,5ц/га, Полісся - 93,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 7,9- 13,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,9 балів, вилягання 8,6- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-79 %. Вміст крохмалю 73,5 - 76,3%, білку 8,1 - 9,4 %.

### ® 04004021 ПР38В91

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - відсутня або дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 70,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 75,6 білку 9,4 %.

### 04004091 Пульс МС 402

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Власник(и):

Підтримувач(и):