

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - короткий, діаметр качана - дуже великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 75,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 74,9 %, білку 8,5 %.

03004035 Садгір

Заявник: Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - червоно-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу 87,5 ц/га, по зоні Полісся 84,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 6,6- 5,1 ц/га. Стійкість до пузирчастої сажки 9 балів, засухи 8,5-8,3 бала. Вміст білку 7,5-8,5%, крохмалю 72,3-74,0%. Вихід зерна 79%.

04004089 Сплав МС 290

Заявник: Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 70,6 ц/га, Лісостепу - 97,7 ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,1 - 12,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,0- 8,7 балів, вилягання 8,3- 8,6 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80,- 81 %. Вміст крохмалю 71,4 - 76,4%, білку 8,7 - 11,1 %.