

® 04004058 Сов 329 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 70,6 ц/га, Лісостепу - 96,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,2 - 5,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 - 9,0 балів, вилягання 8,7 - 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 75,7 - 76,5 %, білку 7,7 - 8,5 %.

03004054 Сенат

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатеподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 78,7 ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 73,5 %, білку 8,5 %.

® 04004054 Товтрянський 188 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) -

від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення шовку - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зонах Лісостепу - 86,0ц/га, Полісся -87,8ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 5,1-8,9ц/га. Стійкість до засухи 8,6-9,0 балів, вилягання -8,8 -9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,0-76,4%, білку 8,4-9,0%.

® 03004022 ТАР 349 МВ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Урожайність по зоні Степу -74,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 76,6 білку 9,2 %.

04004062 Ушицький 167 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу -66,0 ц/га, Лісостепу - 81,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 8,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,6- 8,7 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 74,7 - 75,2%, білку 8,6 - 9,1 %.