

від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення шовку - помірне. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластиинка листка за ширину ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зонах Лісостепу - 86,0 ц/га, Полісся - 87,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 5,1-8,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,6-9,0 балів, вилягання - 8,8-9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,0-76,4%, білку 8,4-9,0%.

## ® 03004022 ТАР 349 МВ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма "Селекта"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма "Селекта"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочек на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластиинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 74,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 76,6 білку 9,2 %.

## 04004062 Ушицький 167 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочек волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластиинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 66,0 ц/га, Лісостепу - 81,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 8,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,7 балів, вилягання 8,6-8,7 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 74,7 - 75,2%, білку 8,6 - 9,1 %.