

® 04004064 Хмельницький

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіас 2000"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 105,5 ц/га, Лісостепу - 95,3ц/га, Полісся - 87,4ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 13,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,8 балів, вилягання 7,8- 8,4 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-82 %. Вміст крохмалю 71,0 - 76,6%, білку 8,7 - 10,1 %.

05004015 Чигиринський 267 СВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною (враховуючи за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу -93,0 ц/га, Полісся - 90,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 7,0 - 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,9 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -80 %. Вміст крохмалю 74,3 - 76,2%, білку 8,5 - 9,4 %.

® 04004071 Яринин 176 СВ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Положення листка листкової пластинки у просторі - похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного