

® 04004064 Хмельницький

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіас 2000"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 105,5 ц/га, Лісостепу - 95,3ц/га, Полісся - 87,4ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 13,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,8 балів, вилягання 7,8- 8,4 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-82 %. Вміст крохмалю 71,0 - 76,6%, білку 8,7 - 10,1 %.

05004015 Чигиринський 267 СВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною (враховуючи за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу -93,0 ц/га, Полісся - 90,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 7,0 - 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,9 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -80 %. Вміст крохмалю 74,3 - 76,2%, білку 8,5 - 9,4 %.

® 04004071 Яринин 176 СВ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Положення листка листкової пластинки у просторі - похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного

цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -- середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність по зоні Лісостепу становить 86,8ц/га, Полісся - 90,3ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,0-9,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,9-9,0 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-79 %. Вміст крохмалю 75,2%, білку 7,8-8,3 %.

Сільськогосподарські: бобові

Горох

® 03001009 Аскет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина без антоціанового забарвлення, низька, з вторинними листочками (листова форма), з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, має середні час цвітіння та достигання. Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів. Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них. Вторинні листочки без воскового нальоту, середнього розміру, з малою їх кількістю, мають коротку відстань від найширшої частини до основи та дуже слабку зубчатість. Прилистки добре розвинуті, без "кролячих вушок", мають восковий наліт, середнього розміру. Квітки на середніх квітконіжках. Парус білого кольору, середнього розміру з прямою основою та помірною інтенсивністю. Чашолистик середньої ширини, з загостреною формою верхівки. Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю. Насінина сферичної форми, без чорного забарвлення рубчика, з жовтим забарвленням та помірною зморшкуватістю сім'ядолей. Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 270 -290 г. Середньопізній, вегетаційний період 95 днів. Напівінтенсивного типу.

Урожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,2 ц / га, що на 4,1 відсотки більше стандартів.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Білка має 22,2 %.

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу. Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів.

® 03001007 Девіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина без антоціанового забарвлення, середньої висоти, без вторинних листочків (вусата форма), з середньою кількістю квіток на вузлі, має середні час цвітіння та достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів.

Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них.

Квітки на середніх квітконіжках по дві на вузлі, білого кольору, середнього розміру та дуже вигнутим парусом, основа якого сильно піднесена.

Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю.

Насінина сферичної форми, з наявним чорним забарвленням рубчика, жовтого забарвлення та відсутньою зморшкуватістю сім'ядолей.