

цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною -- середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність по зоні Лісостепу становить 86,8 ц/га, Полісся - 90,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,0-9,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,9-9,0 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-79 %. Вміст крохмалю 75,2%, білку 7,8-8,3 %.

Сільськогосподарські: бобові Горох

® 03001009 Аскет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослина без антоціанового забарвлення, низька, з вторинними листочками (листкова форма), з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, має середні час цвітіння та досягнення. Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів. Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них.. Вторинні листочки без воскового нальоту, середнього розміру, з малою їх кількістю, мають коротку відстань від найширшої частини до основи та дуже слабку зубчастість. Прилистки добре розвинуті, без "кролячих вушок", мають восковий наліт, середнього розміру. Квітки на середніх квітконіжках. Парус білого кольору, середнього розміру з прямою основою та помірною інтенсивністю. Чашолистик середньої ширини, з загостреною формою верхівки. Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю. Насінина сферичної форми, без чорного забарвлення рубчика, з жовтим забарвленням та помірною зморшкуватістю сімядолей. Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 270 -290 г .Середньопізній , вегетаційний період 95 днів .Напівінтенсивного типу .

Урожайний .На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,2 ц / га , що на 4,1 відсотки більше стандартів .
Агротехніка звичайна для зони вирощування .Білка має 22,2 %.

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу .Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів .

® 03001007 Девіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина без антоціанового забарвлення, середньої висоти, без вторинних листочків (вусата форма), з середньою кількістю квіток на вузлі, має середні час цвітіння та досягнення.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів.

Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них..

Квітки на середніх квітконіжках по дві на вузлі, білого кольору, середнього розміру та дуже вигнутим парусом, основа якого сильно піднесена .

Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю.

Насінина сферичної форми, з наявним чорним забарвлення рубчика, жовтого забарвлення та відсутнію зморшкуватістю сімядолей.