

цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -- середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність по зоні Лісостепу становить 86,8ц/га, Полісся - 90,3ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,0-9,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,9-9,0 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-79 %. Вміст крохмалю 75,2%, білку 7,8-8,3 %.

Сільськогосподарські: бобові

Горох

® 03001009 Аскет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина без антоціанового забарвлення, низька, з вторинними листочками (листова форма), з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, має середні час цвітіння та достигання. Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів. Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них. Вторинні листочки без воскового нальоту, середнього розміру, з малою їх кількістю, мають коротку відстань від найширшої частини до основи та дуже слабку зубчатість. Прилистки добре розвинуті, без "кролячих вушок", мають восковий наліт, середнього розміру. Квітки на середніх квітконіжках. Парус білого кольору, середнього розміру з прямою основою та помірною інтенсивністю. Чашолистик середньої ширини, з загостреною формою верхівки. Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю. Насінина сферичної форми, без чорного забарвлення рубчика, з жовтим забарвленням та помірною зморшкуватістю сім'ядолей. Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 270 -290 г. Середньопізній, вегетаційний період 95 днів. Напівінтенсивного типу.

Урожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,2 ц / га, що на 4,1 відсотки більше стандартів. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Білка має 22,2 %.

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу. Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів.

® 03001007 Девіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина без антоціанового забарвлення, середньої висоти, без вторинних листочків (вусата форма), з середньою кількістю квіток на вузлі, має середні час цвітіння та достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів.

Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них.

Квітки на середніх квітконіжках по дві на вузлі, білого кольору, середнього розміру та дуже вигнутим парусом, основа якого сильно піднесена.

Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю.

Насінина сферичної форми, з наявним чорним забарвленням рубчика, жовтого забарвлення та відсутньою зморшкуватістю сім'ядолей.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 260 -270 г. Середньостиглий , вегетаційний період 85 -97 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .
За даними заявника норма висіву 1,0 - 1 ,2 млн/ га схожих насінин .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 36,1 -37,6 ц/га , що на 15,9-20,9 відсотків більше стандартів . Білка має 21,9-23,4% .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Аскохітозом та коренивими гнилями уражується нижче стандартів .

® 03001006 Ескіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослини сорту мають середню висоту, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, середнього часу цвітіння та досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має середню кількість вузлів.

Листок помірно зелений з довгим черешком. Прилисток середньої величини, добре розвинений, без наявної формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, з середньою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка, з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика. Парус білого кольору, з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб довгий, вузький, жовтого кольору, має середню кількість насінних зачатків, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву. Форма зовнішньої частини верхівки бобу - загострена. Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглих насінин - помірна.

Насінина сферичної форми, з сім'ядолями жовтого кольору без зморшкватості та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 250 -270 г .Середньопізній , вегетаційний період 96 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .

За даними заявника норма висіву 1,1 -1,2 млн/ га схожих насінин .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,9 ц / га , що на 15,4 відсотки більше стандартів .Білка має 23,1 % .

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу . Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів .

® 04001007 Фаргус

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від двох до трьох, мають пізній час цвітіння та ранній час досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має багато вузлів.

Черешок листка середньої довжини . Прилисток добре розвинений, з наявною формою "кролячих вух" та восковим нальотом, має середню довжину