

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 260 -270 г. Середньостиглий , вегетаційний період 85 -97 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .  
За даними заявника норма висіву 1,0 - 1 ,2 млн/ га схожих насінин .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 36,1 -37,6 ц/га , що на 15,9-20,9 відсотків більше стандартів . Білка має 21,9-23,4% .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Аскохітозом та коренивими гнилями уражується нижче стандартів .

### ® 03001006 Ескіз

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Рослини сорту мають середню висоту, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, середнього часу цвітіння та досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має середню кількість вузлів.

Листок помірно зелений з довгим черешком. Прилисток середньої величини, добре розвинений, без наявної формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, з середньою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка, з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика. Парус білого кольору, з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб довгий, вузький, жовтого кольору, має середню кількість насінних зачатків, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву. Форма зовнішньої частини верхівки бобу - загострена. Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглих насінин - помірна.

Насінина сферичної форми, з сім'ядолями жовтого кольору без зморшкватості та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 250 -270 г .Середньопізній , вегетаційний період 96 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .

За даними заявника норма висіву 1,1 -1,2 млн/ га схожих насінин .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,9 ц / га , що на 15,4 відсотки більше стандартів .Білка має 23,1 % .

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу . Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів .

### ® 04001007 Фаргус

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

**Власник(и):** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

**Підтримувач(и):**

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від двох до трьох, мають пізній час цвітіння та ранній час досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має багато вузлів.

Черешок листка середньої довжини . Прилисток добре розвинений, з наявною формою "кролячих вух" та восковим нальотом, має середню довжину

та ширину, з щільною плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має малу ширину чашолистка з округлою формою верхівки верхнього чашолистика. Колір паруса від білого до кремового, з малою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий і широкий, жовтого кольору, з відсутньою пергаментністю та наявним потовщенням ступок, з увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву. Шов бобу з відсутніми або рудиментальними волокнами.

Насінина циліндричної форми, з сім'ядолями жовтого кольору зі слабкою їх зморшкуватістю та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 235 - 245 г. Середньостиглий, вегетаційний період 82 - 95 см. Сорт інтенсивного типу, придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,0 - 1,2 млн / га схожих насінин.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Білка має 21,6 - 25,8 %.

Високоврожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 39,1 - 41,3 ц / га, що на 15,1 - 25,9 відсотків більше стандартів, максимальний 59 ц / га.

Аскохітозом та корневими гнилями уражується нижче стандартів.