

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник

04017039 Абсолют

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - темний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гіbrid. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 30,5 ц/га, гарантована добавка 5,2 ц/га. Вміст жиру 49,6 %, білку 17,8%. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 04017049 Всесвіт

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення - помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубчасті квітки за кольором помірно-жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гіybrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 28,7 ц/га, Лісостепу 30,1 ц/га. Гарантована добавка 3,7 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 48,4 - 49,9 %, білку 17,6 - 18,2 %. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

05017009 Віста

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення

приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,7 ц/га, Лісостепу 32,4 ц/га. Гарантована добавка 5,7 - 7,9 ц/га. Вміст жиру 50,6 - 51,6 %, білку 16,6 - 17,2 %. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне

04017010 Заграва

Заявник: ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНИС)"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка велика, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формуєю - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Лісостепу 25,3 ц/га, гарантована добавка 3,5 ц/га. Вміст жиру 48,2%, білку 17,5%. Гіybrid відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

04017006 Зевс

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення - помірна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формуєю - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гіybrid. Середня урожайність в зоні Лісостепу становила 27,2 ц/га, гарантована добавка 2,7 ц/га. Вміст жиру 51,5 %, білку 17,1 %. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017028 Іберіко

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(и):