

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром середній, зубці грубі, вушка великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка увігнута. Розмір сім'янки - великий, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 25,6 ц/га, гарантована добавка 1,1 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 16,9%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 04017056 Карат

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - округла, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га. Гарантована добавка 5,5 ц/га. Вміст жиру 51,2 %, білку 16,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

03017051 КВС Гелія 04 РО

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення - помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - середня, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, Лісостепу 29,4 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 4,9 ц/га. Вміст 49,5 - 50,0 %, білку 16,0 - 17,5 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.