

**Підтримувач(і):**

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки помірна. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середній урожай за роки випробування становив в зоні Степу 23,6 ц/га, Лісостепу 23,8ц/га. Гарантована добавка 1,9 - 2,1 ц/га. Вміст жиру 48,2%, білку 17,3%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

**® 05017002 Морава**

**Заявник:** Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

**Власник(и):** Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

**Підтримувач(і):**

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма з боку сім'янок сильно випукла, Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма (з боку сім'янок) - сильно випукла, сім'янка за розміром середня, форма широко яйцеподібна, за основним кольором чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 29,8 ц/га, Лісостепу 29,0 ц/га. Гарантована добавка 4,5 - 4,9 ц/га. Вміст жиру 50,4 - 51,2 %, білку 16,0 - 16,4 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

**® 05017004 Монарх**

**Заявник:** Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

**Власник(и):** Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

**Підтримувач(і):**

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною короткі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній,

форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,2 ц/га, Лісостепу 31,8 ц/га. Гарантована добавка 5,7 - 10,0 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 51,6 %, білку 16,7 - 17,2 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04017059 НК Долбі**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,9 ц/га, Лісостепу 29,9 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,7 %, білку 16,4 - 18,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04017061 НК Ферті**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована добавка 6,6 ц/га. Вміст жиру 50,6 %, білку 16,9%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04017058 НК Мелдімі**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за