

форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий високоолеїновий гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,2 ц/га, Лісостепу 31,8 ц/га. Гарантована добавка 5,7 - 10,0 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 51,6 %, білку 16,7 - 17,2 %. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017059 НК Долбі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опущеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формуєю - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,9 ц/га, Лісостепу 29,9 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,7 %, білку 16,4 - 18,0 %. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017061 НК Ферти

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опущеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, за формуєю - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гіybrid. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована добавка 6,6 ц/га. Вміст жиру 50,6 %, білку 16,9%. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017058 НК Мелдімі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опущеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за