

форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,2 ц/га, Лісостепу 31,8 ц/га. Гарантована добавка 5,7 - 10,0 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 51,6 %, білку 16,7 - 17,2 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04017059 НК Долбі**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,9 ц/га, Лісостепу 29,9 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,7 %, білку 16,4 - 18,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04017061 НК Ферті**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована добавка 6,6 ц/га. Вміст жиру 50,6 %, білку 16,9%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### **04017058 НК Мелдімі**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за

формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження наявне лише біля основи. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями дуже сильна, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 34,6 ц/га, Лісостепу 30,8 ц/га. Гарантована добавка 4,6 - 8,1 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 18,4 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період вивчення гібрид уражувався хворобами в незначній мірі. Особливістю гібриду є стійкість до гербіцидів групи ІМІ.

### **04017054 Оберіг**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,7 ц/га, Лісостепу 28,7 ц/га. Гарантована добавка 4,1-6,8 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 51,6%, білку 16,9 - 18,0%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

### **® 04017067 Онікс**

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Власник(и): Сумський національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий сорт кондитерського напрямку. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 23,9 ц/га, Лісостепу 23,1 ц/га. Гарантована добавка 3,9 - 5,0 ц/га. Вміст жиру 44,8 - 46,4 %, білку 18,4 - 19,2 %. Сорт середньостійкий до вилягання, відносно стійкий до осипання та посухи. За період вивчення ураження хворобами незначне.