

середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях відсутня або дуже слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 32,4 ц/га, Лісостепу 32,8 ц/га. Гарантована добавка 7,5 - 8,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 51,5 %, білку 16,2 - 17,8 %. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

05017041 Термінатор

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - дуже довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 31,4 ц/га, Лісостепу 32,4 ц/га. Гарантована добавка 5,1 - 6,0 ц/га. Вміст жиру 50,5 - 51,0 %, білку 16,0 - 16,5 %. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017055 Форум

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гіybrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 24,5 ц/га, Лісостепу 27,2 ц/га. Гарантована добавка 2,9 - 5,4 ц/га. Вміст жиру 48,6 - 52,3%, білку 16,0 - 18,0%. Гіybrid відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 03017047 ЧaC

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Власник(и): Сумський національний аграрний університет