

широкояйцевидний, за формою верхівки заокруглений, за розміром великий. Квітка біла. Біб коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 203 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 22,5, Полісся - 20,8 ц/га. Вміст жиру – 23,4 %, білку – 37,6 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

### **04018005 Вілана**

**Заявник:** Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напіввистиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною середнє (7,0-12,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина куляста, жовта, рубчик світло-коричневий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) ранній.

Маса 1000 насінин - 162 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Степу - 19,8, Лісостепу - 26,3 ц/га. Вміст жиру – 23,3 %, білку – 38,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 16,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

### **® 04018014 Величава**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок клиновидний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною вузький (<9,0), прямий. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середній.

Маса 1000 насінин - 165-175 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,8, Полісся - 20,3 ц/га. Вміст жиру – 23,4 %, білку – 36,6 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,2 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

### **® 04018015 Версія**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною короткий (<40,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овальна, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 165-170 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 25,9, Полісся - 21,6 ц/га. Вміст жиру – 22,6 %, білку – 37,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

**® 03018016 Діона**

**Заявник:** Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок ланцетний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,0-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин - 166,6 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 22,0, Полісся - 22,6 ц/га. Вміст жиру – 22,3 %, білку – 36,1 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 12,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

**04018004 Дельта**

**Заявник:** Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною середнє (7,0-12,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною середній (9,1-12,0), серповидний. Насінина куляста, жовта, рубчик сірий, лілійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин - 132 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 25,6 ц/га. Вміст жиру – 22,3 %, білку – 37,3 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,7 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.