

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною короткий (<40,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овальна, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 165-170 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 25,9, Полісся - 21,6 ц/га. Вміст жиру – 22,6 %, білку – 37,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

® 03018016 Діона

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок ланцетний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,0-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин - 166,6 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 22,0, Полісся - 22,6 ц/га. Вміст жиру – 22,3 %, білку – 36,1 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 12,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

04018004 Дельта

Заявник: Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною середнє (7,0-12,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною середній (9,1-12,0), серповидний. Насінина куляста, жовта, рубчик сірий, лілійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин - 132 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 25,6 ц/га. Вміст жиру – 22,3 %, білку – 37,3 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,7 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.