

® 04018009 КиВін

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут кормів Української академії аграрних наук

Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) середня (71-90 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. Біб сірий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), прямий. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 146,3 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 21,1 ц/га. Вміст жиру – 23,2 %, білку – 36,2 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,3 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018012 Мельпомена

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – проміжний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною короткий (<40,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) пізній.

Маса 1000 насінин - 164,4 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 26,0 ц/га. Вміст жиру – 22,7 %, білку – 36,9 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 16,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018008 Омега вінницька

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут кормів Української академії аграрних наук

Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 147 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 21,8 ц/га. Вміст жиру – 22,9 %, білку – 36,8 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 15,1 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.
Рекомендований для зони Лісостепу.

® 03018017 Прип'ять

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Соля - Сєвер Ко"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Соля - Сєвер Ко"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – проміжний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб коричневий, за довжиною середній (40,0-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) ранній.

Маса 1000 насінин - 156 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,8, Полісся - 20,4 ц/га. Вміст жиру – 23,1 %, білку – 37,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 11,6 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.
Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

® 03018014 Склея

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною середній (9,1-12,0), прямий. Насінина округло-випукла, жовто-зелена, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньопізній.

Маса 1000 насінин - 160-170 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,2 ц/га. Вміст жиру – 22,9 %, білку – 37,5 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,1 см. Напрямок використання – зерно-кормовий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.
Рекомендований для зони Лісостепу.