

## Ріпак озимий

### ® 04016003 Аліот

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Колодій Юрій Антонович

Ситнік Ігор Данилович

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - коротка. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність по зонах Степу - 38,0ц/га, Лісостепу - 34,0ц/га, Полісся - 40,0ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,5 - 8,5 ц/га. Стійкість до вилягання 8,3 - 9,0, засухи 7,9 - 8,7, осипання 8,0 - 8,5 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 8,6 - 8,9, бактеріозом 8,7-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаківим квіткоїдом 8,7-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюकोзинолатів 0,6-0,7%. Вміст жиру 45,5-49,8%, білку 21,6-23,9балів.

### 02016011 Анна

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середнього розміру. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Черешок листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середнього розміру. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 33,8ц/га, Полісся - 36,9ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,0 - 5,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,7 - 8,9 засухи 7,9 - 8,4, осипання 8,1 - 8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 8,7 - 8,9, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаківим квіткоїдом 8,5-8,7 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюकोзинолатів 0,7-0,8%. Вміст жиру 47,5-49,7%, білку 21,9-22,9балів.

### ® 04016004 Вектра

Заявник: "Рапс ГБР" насінневе господарство

Власник(и): "Рапс ГБР" насінневе господарство

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середнього розміру. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий, широкий з середньою кількістю часток. Черешок листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 35,8ц/га, Полісся - 38,5ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,7 - 6,8 ц/га. Стійкість до вилягання 8,8 - 8,9 засухи 7,9 - 8,4, осипання 8,2 - 8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 8,6 - 8,9, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаківим квіткоїдом 8,7-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюकोзинолатів 0,7-0,8%. Вміст жиру 46,5-49,3%, білку 22,9-23,9балів.