

® 04016007 Таурус

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Власник(и): Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Підтримувач(і): Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною довгі, за шириною широкі. Листок темно-зелений, за довжиною довгий, за шириною широкий, зубчастість краю слабка. Час цвітіння середній. Рослина за висотою середня. Пелюстки квітки жовті, за довжиною довгі, за шириною середні. Стручок та його зубець довгий, довжина ніжки стручка середня. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби сильна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 34,8ц/га, Полісся - 38,9ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,8-7,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,8 -9,0 засухи 7,9 - 8,2, осипання 8,2 -8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,7-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,3-0,4%. Вміст жиру 46,3-49,1%, білку 22,5 - 23,9балів.

Ріпак ярий**05016002 Кріс**

Заявник: Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною та довжиною середні. Зубчастість краю листка слабка. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - коротка. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву помірна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 25,8ц/га, Полісся - 28,4ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,0-5,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,5 -8,9 засухи 7,5 - 8,0, осипання 8,1 -8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,5-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,3-0,4%. Вміст жиру 44,5-45,7%, білку 23,5 - 23,9балів.

® 03016011 Сріблястий 1

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною та довжиною середні. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з малою кількістю часток. Довжина черешка листка- середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки білий. Стручок середнього розміру. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву відсутня або дуже слабка.

Урожайність по зонах Степу - 20,1Лісостепу - 24,7ц/га, Полісся - 27,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,0-5,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,5 - 8,7 засухи 7,5 - 8,0, осипання 8,1 -8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,6-8,8 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,5-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,7-0,8%. Вміст жиру 43,7 - 45,5%, білку 21,5 - 22,9 балів.