

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 14023006 Назва сорту: Атанас **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.02.2018 **Патент №** 180033

Дата пріоритету: 05.11.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший fertильний вузол включно)	велика	7
6	Листки: забарвлення	зелене	2
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5
8	Листок: листочки	відсутні	1
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0
10	Листочек: розмір	ознака не визначається	0
11	Листочек: за довжиною	ознака не визначається	0
12	Листочек: за шириною	ознака не визначається	0
13	Листочек: положення найширошої частини	ознака не визначається	0
14	Листочек: зубчастість	ознака не визначається	0
15	Прилисток: за довжиною	середній	5
16	Прилисток: за шириною	середній	5
17	Прилисток: розмір	середній	5
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7
24	Рослина: час цвітіння	середній	5
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1
28	Квітка: парус за ширину	середній	5
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5
31	Квітка: чашолисток за ширину	середній	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	середня	5
34	Квітконос: відстань від стебла до первого бобу	середня	5
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2
37	Біб: за довжиною	довгий	7
38	Біб: за ширину	середній	5
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1
43	Біб: забарвлення	зелене	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
48	Насіння: форма	неправильна	4
49	Насіння: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насіння: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насіння: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насіння: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіння: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса	середня	5
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	ознака не визначалась	0
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,5	27,5	29,4
Довірчий інтервал, ц/га (+)	1,4	1,6	1,3
урожайність, ц/га	20,1	29,0	28,3
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	0,6	1,5	-1,1
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	3	5	-4
Тривалість періоду вегетації, діб	79	82	87
Висота рослини, см	64,7	70,6	74,2
Маса 1000 насінин, г	235,3	224,4	226,8
Стійкість до вилягання, бал	7,0	6,9	7,4
Стійкість до обсипання, бал	8,3	8,2	8,5
Стійкість до посухи, бал	8,1	8,3	8,2
Придатність до механізованого збирання, бал	7,6	7,6	8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	44,1	47,1	48,2
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8,5	8,7	8,6
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	8,7	8,7	8,7
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерна), бал	8,4	8,6	8,6
Стійкість проти антракнозу, бал	8,8	8,7	8,5
Вміст білка, %	25,5	25,2	25,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.