

антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсуинім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний та короткий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, широке, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка білого кольору, коротка, середньої ширини та дрібна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 82 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 96 днів.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 38,3 ц/га. Маса 1000 зерен 37,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Сорт здатний накопичувати білок, вміст білка від 14,6 до 20,8% , (середній вміст білка 17,1%), вміст клейковини — 35,4%, клейковина розтяжна та еластична, відноситься до 1 групи якості, сила борошна 392 о. а. Реологічні властивості тіста відмінні: відношення пружності до розтяжності 0,8-1,1, що дає можливість у більшості випадків одержувати високий об'єм хліба до 1400 мл, середній об'єм хліба зі 100 г борошна — 1020 мл. Сильна пшениця, відмінний поліпшувач.

### 05007057 Струна миронівська

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний та довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече пряме, широке, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 76-81 см. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 98-101 добу.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 53,2 ц/га, Полісся 49,6 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 6,4 ц/га, Полісся — 7,2 ц/га. Маса 1000 зерен 41,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,1-13,9% білка, клейковини — 26,9-28,6%, сила борошна — 245-281 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 980-1080 мл. Цінна пшениця.

### 04007053 Торчинська

Заявник: Селянсько фермерське господарство "Родень 10"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має відсутній або дуже слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом, остюки або зубці відсутні. Нижня колоскова луска: овальна, плече пряме, широке, зубець прямий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, коротка, вушка та середньої крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 86-90 см. Стійкість сорту до вилягання 8,1-8,5 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,7-8,8 бала. За роки

випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 100-102 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 52,0 ц/га, Полісся 49,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,2 ц/га, Полісся 6,7 ц/га. Маса 1000 зерен 37,8-39,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,0% білка, клейковини — 26,9%, сила борошна — 265-291 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 990-1000 мл. Цінна пшениця.

### **06007005 Тюбалт**

**Заявник:** Заатен-Уніон ГмБХ

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини дуже низькі. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із слабким восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече округле, широке, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 68-77 см. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 100-101 добу.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 44,6 ц/га, Лісостепу 51,8 ц/га, Полісся 48,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 9,0 ц/га, Лісостепу — 5,0 ц/га, Полісся — 5,8 ц/га. Маса 1000 зерен 36,0-40,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,5-14,3% білка, клейковини — 27,7-29,7%, сила борошна — 268-353 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1000-1100 мл. Цінна пшениця.

### **06007024 Хофман**

**Заявник:** Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, дуже нещільний та довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 97см. Стійкість сорту до вилягання 7,9 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 104 доби.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 44,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 40,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,6% білка, клейковини 27,2%, сила борошна 251о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 940 мл. Філер.