

**Пшениця м'яка двуручка****04007013 Хуторянка**

Заявник: Фермерське господарство "Теософ"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — двуручка (альтернативний). Куц — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабвовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування нижчесередня-низька, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 7,7 бала. Рекомендовано висівати у озимому посіві в кінці строків посіву озимини. Вимагає ранньої весняної сівби, можна висівати у „лютневі вікна”. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 7,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 286 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 65,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 4,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,6% білка, клейковини — 27,9%, сила борошна — 375 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100 мл. Цінна пшениця.

**Пшениця тверда озима****04008002 Кассіопея**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Куц - прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві та сильний на листовій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокоричневого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабе опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, циліндричної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при досяганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньозігнутий, короткий.

Рослини заввишки 78-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 270-278 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,7 ц/га, Лісостепу 51,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,8 ц/га, Лісостепу — 2,6 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7-43,6 г. Зерно містить 13,5-14,5% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

**05008001 Континент**

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та листовій пластинці з нижнього боку. Остюки білого кольору з слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має помірний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, пірамідальної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при досяганні і має сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече скошене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий.

Висота рослин 73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 270-280 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,8 ц/га, Лісостепу 51,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,7 ц/га, Лісостепу — 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8-43,2 г. Зерно містить 14,3% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

### Пшениця тверда яра

#### **05008006 Жізель**

**Заявник:** Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабо виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням верхнього вузла. Колос білий або солом'яно-жовтий, слабо забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світлокоричневого кольору. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене та вузьке, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення зовнішньої поверхні - відсутнє. Зернівка яйцеподібна, має чубчик короткий. Язичок - довгий, трикутний, вушка: охоплення соломини - неповне.

Висота рослин 100-106 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,0-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 95-100 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 42,1 ц/га, Полісся 40,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся 2,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,3-45,6 г. Зерно містить 13,9-14,4% білка, загальна оцінка макарон 8,5 бала.

#### **05008007 Нащадок**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на нижньому боці листової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина помірно виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням верхнього вузла. Колос червоний, слабо забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світлокоричневого кольору. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення зовнішньої поверхні - наявне. Зернівка видовжена, має чубчик короткий. Язичок - середній, кільцевий, вушка: охоплення соломини - повне.

Висота рослин 83-106 см. Стійкість сорту до вилягання 7,2-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,0-8,5 бала. За роки