

## Тритикале озиме

### **04011008 Валентин 90**

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — напівпрямий. Пропорцевий листок: мало рослин з похилим пропорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньовиповнена з помірним опущенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середньої щільності, широкий та довгий, піраміdalnoї форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкоzmоршкувата.

Висота рослин 102-103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 280-295 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,7 ц/га, Полісся 52,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 9,6 ц/га, Полісся — 3,9 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4-46,5 г. Зерно містить 12,6-13,0% білка.

### **04011001 Інтерес**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — прямий. Пропорцевий листок: середня кількість рослин з похилим пропорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка середньої довжини та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з слабким опущенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, середньої довжини та вузький, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець середній, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, зморшкувата.

Рослини заввишки 96-106 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 274-290 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 54,7 ц/га, Лісостепу 60,6 ц/га, Полісся 54,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,0 ц/га, Лісостепу — 5,5 ц/га, Полісся — 5,6 ц/га. Маса 1000 зерен 42,4-45,9 г. Зерно містить 13,3-13,7% білка.

### **04011010 Пурпурний**

Заявник: Селянсько фермерське господарство " Родень 10"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — напівпрямий. Пропорцевий листок: середня кількість рослин з похилим пропорцевим листком,

антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньовиповнена з помірним опущенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середньої цільності, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкоzmоршкувата.

Висота рослин 102-104 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 280-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 57,4 ц/га, 51,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,3 ц/га, Полісся 2,5 ц/га. Маса 1000 зерен 48,4-50,2 г. Зерно містить 13,6-13,9% білка.

## 04011004 Раритет

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — напіврозлогий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина порожниста з помірним опущенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, щільний, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкоzmоршкувата.

Висота рослин 111-112 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 279-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,9 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,8 ц/га, Полісся — 4,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7-46,3 г. Зерно містить 12,6-13,6% білка.

04011004 внесені в