

Овес ярий**04005004 Житомирський**

Заявник: Державний вищий навчальний заклад "Державний агроєкологічний університет"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за габітусом напівпряма, середньої довжини, рослини із закрученими прапорцевими листками рідко зустрічаються, час викидання волоті – дуже ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла помірна. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини, сіруватість помірна. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Тип розвитку - ярий. Різновидність - мутіка. Середньостиглий, вегетаційний період -102 дні. Стійкий до полягання, осипання та посухи. Урожайний.

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай - 50,9 ц / га, що на 2,2 ц / га більше стандартів. Вирівняність зерна 95 %, плівчастість - 26,3 %. Бактеріальним опіком, корончастою іржею уражувався від слабого до середнього.

Придатний для поширення зони Полісся.

Ячмінь озимий**04012019 Сейм**

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, низькі. Прапорцевий листок з слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, слабе антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 3,0 ц/га. Вегетаційний період 260 днів. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси, бурої іржі, та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання, вилягання, та засухи. Вміст білку 13,0%. В зоні Полісся середня урожайність сорту 50,3 ц/га. Гарантована прибавка врожаю 0,5 ц/га. Вегетаційний період 275 днів. Сорт стійкий до хвороб, борошністої роси, бурої іржі. Стійкий до осипання, та засухи. Вміст білку 13,6%. Сорт відноситься до середньонижчої і середньої групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

05012005 Сіндерелла

Заявник: Дойче Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):