

## Сорго-суданкові гібриди

### **04063002 Арабат**

**Заявник:** Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має дуже сильне антоціанове забарвлення.

У рослин спостерігається середній час викидання волоті.

Габітус - напіврозлогий, гібриди мають середню кількість пагонів, і велику кількість листків. Стебло середнє за товщиною. Рослина - висока. Листок широкий, середній за довжиною. Суцвіття нещільне, розкидисте, довге. Колоски видовжені за формою. Колоскова луска має зелено-жовте забарвлення під час цвітіння. За досягання колоскова луска набуває червонувато-коричневого кольору.

Насінина після досягання солом'яно-жовтого кольору, середня за масою 1000 насінин.

Гібрид посухостійкий, незначно уражається хворобами. За роки випробування середня урожайність сухої речовини становила 107,2 ц/га. Висота рослин 189-200 см. Залістяність – 39,5-44,1%. Вміст сирого протеїну – 9,8%, клітковини – 30,9%. Середньостиглий.

### **03063001 Кадан 19**

**Заявник:** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має сильне антоціанове забарвлення.

У рослин спостерігається пізній час викидання волоті.

Габітус - напіврозлогий, гібриди мають малу кількість пагонів і середню - листків. Стебло середнє за товщиною. Рослина - середня за висотою. Листок широкий, середній за довжиною. Суцвіття нещільне, розкидисте, довге. Колоскова луска має жовто-зелене забарвлення під час цвітіння, слабке опушення. За досягання колоскова луска і насінина набувають світло-коричневого кольору. Маса 1000 насінин - середня.

Гібрид відноситься до середньостиглої групи стиглості. Висота рослин 196-224 см. Залістяність – 33,7-36,4%. Характеризується високою посухостійкістю, стійкістю до вилягання та незначно уражається хворобами. Вміст сирого протеїну - 8,7%, клітковини – 31,6%. За роки випробування середня урожайність сухої речовини становила 95,9 ц/га.

### **04063001 Чудовий ВМР**

**Заявник:** Дочірнє підприємство "Рейлін"

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток, а потім і листкова пластинка, мають дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення.

У рослин спостерігається пізній час викидання волоті.

Габітус - напіврозлогий, гібриди мають середню кількість пагонів і листків. Стебло середнє за товщиною. Рослина - середня за висотою. Листок широкий, дуже довгий. Суцвіття середнє за щільністю, напіввиступає, довге. Колоски овальні за формою, мають слабке опушення. Колоскова луска має жовте забарвлення під час цвітіння, відсутнє або слабке антоціанове забарвлення. За досягання колоскова луска набуває темно-червоного кольору.

Насінина після досягання жовтувато-білого кольору, середня за масою 1000 насінин.