

Гібрид - високоврожайний, інтенсивно росте на початку вегетації і добре відростає після косіння. Гібрид переважає інші завдяки високій залистяності – 45,1-55,0%. Висота рослин 195 см. Вміст сирого протеїну 8,7-9,1%, клітковини – 30,5-31,6%. Середня урожайність сухої речовини становила за роки випробування - 99,3 ц/га. Гібрид відзначається соковитістю, стійкістю до хвороб, посухостійкістю, відноситься до групи середньостиглих.

Костриця східна

06110001 Лиманська

Заявник: Донецький ботанічний сад Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Габітус напівпрямий. Рослина середньої висоти. Листок довгий, середній за шириною. Суцвіття довге, має середню кількість колосків. Тенденція до утворення суцвітть в рік сіви помірною.

Багаторічний кореневищний злак висотою 94-123 см. Ранньостиглий. Інтенсивний ріст починається при середньодобовій температурі 15 градусів. Сорт має добру залистяність 60-70%. Може давати 2-3 укуси. Зимостійка. Характеризується стійкістю до хвороб, мало пошкоджується шкідниками. Середня урожайність сухої речовини - 80,9 ц/га, максимальна – 100,0 ц/га. Вміст клітковини -23,1%. Довговічна в ценозах з іншими видами злаків і бобовими, на одному місці у травостої зберігається до 20 років.

Костриця лучна

03054001 Діброва

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина: габітус (восени в рік посіву) – напівпрямий, тенденція утворення суцвіття в рік посіву – відсутня або дуже слабка, час появи суцвіття ранній.

Габітус при появі суцвіття – напівпрямий, натуральна висота при появі суцвіття – довга. Листок: колір (восени в рік посіву) – зелений. Прапорцевий листок: довжина (прапорцевий листок на середньому стеблі впродовж 2 тижнів після появи суцвіття) – середній, ширина (прапорцевий листок на середньому стеблі впродовж 2 тижнів після появи суцвіття) – широкий. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – середнє.

Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу куцистість. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування становила – 78,4 ц/га, максимальна – 97,1 ц/га. Залістяність – 49,8%. Вміст сирого протеїну - 8,3 %, клітковини – 31,4 %. Середньостиглий, сінокісно-пасовищного типу.