

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 14045011 Назва сорту:** Златослава **Заявник (код):** 1987 **Власник сорту (код):** 1987

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.03.2018 **Патент №** 180753

**Дата пріоритету:** 07.11.2014

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насінина: розмір	малий	3
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,9	21,7	18,3
± до усередненої урожайності, ц/га	0,1	0,4	-2,2
± до усередненої урожайності, %	0	2	-11
Маса 1000 насінин, г	121,8	137,5	141,0
Висота рослин, см	68,6	68,3	76,4
Стійкість до вилягання, бал	8,6	8,3	8,9
Стійкість до осипання, бал	9,0	9,0	8,8
Стійкість до засухи, бал	8,2	8,3	8,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,6	13,0	11,4
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	8,8	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	8,8	9,0	8,9
Стійкість до бактеріозу, бал	8,8	8,3	8,6
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	8,8	9,0
Вміст білка, %	39,2	38,9	38,0
Вміст олії, %	23,4	22,2	21,4
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	14,8	21,3	20,5
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,32	0,50	0,57

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.