

довжини та щільності. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий, вегетаційний період 84 - 96 днів. Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на повне мінеральне живлення. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 - 4,5 млн / га насінин. Дуже реагує на запізнення із сівбою. Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортодослідних станціях отримали середній урожай - 47,1 - 53,2 ц / га, що на 8,8 - 12,1 ц / га більше стандартів. Потенційна можливість сорту - 90 ц / га. Стійкий проти вилягання, осипання. Посухостійкість середня. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,5%. Борошнистою росю уражується на рівні стандартів. Придатний для поширення в зонах Лісостеп та Полісся.

06012006 Брюсефілд

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Куц напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок дуже слабке, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої щільності та довжини. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий, вегетаційний період 96 днів. Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 53,8 ц / га, що на 13 ц / га більше стандартів. Потенційна можливість сорту 95 ц / га. Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Стійкий до полягання, осипання. Білка має 13 - 14%. На рівні стандартів пошкоджується листостеблевими хворобами, стійкий до летючої сажки. Рекомендований для поширення в зоні Полісся.

04012018 Виклик

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньоранній, вегетаційний період 88 - 98 днів. Сорт напівінтенсивного типу. В закладах експертизи за роки випробування отримали середній