

Габітус - напівпрямий. Листок середнього розміру.

Час початку цвітіння - ранній.

Частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька, а з кремовими і жовтими квітками дуже низька або зовсім відсутня.

Висота рослини в стадії викидання квіткового бутона, після 1-2 скошування від середньої до високої, а після 3-го - середня.

Сорт інтенсивного типу, характеризується високою урожайністю сухої речовини та насіння. Має скорочений період спокою і за рахунок цього відрізняється активним ростом рослин в осінній період при невисоких температурах і зменшенні тривалості дня. При достатній вологозабезпеченості у цей період формує додатковий укіс, що суттєво підвищує загальний урожай фуражу на протязі одного сезону. Середня урожайність сухої речовини становить - 112,0 ц/га, максимальну 120,2, насіння - 2,96 ц/га. Має високу зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до бурої, жовтої плямистості, стійкий до кореневої гнилі. Залистяність - 51,0 - 53,0 %. Вміст білку - 18,3 %, клітковини - 33,5%. Потягом року може дати 2-4 укуси. Сорт середньостиглий - від весняного відростання до дозрівання першого укусу 71-74 днів, насіння - 121 - 124 днів.

03392001 Росинка

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Висота рослини - від середньої до високої.

Габітус - напівпрямий. Листок зеленого забарвлення середнього розміру.

Час початку цвітіння - ранній. Частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька.

Після 3-го скошування рослина характеризується середньою висотою.

Сорт інтенсивного типу, відрізняється високою посухостійкістю та зимостійкістю. В умовах жорсткої посухи формує повноцінний травостій. Середня урожайність сухої речовини становить - 54,7 ц/га, максимальна - 80,0 ц/га, насіння - 2,6 ц/га. Вміст білку - 16,8 %, клітковини - 37,0%. Має високу стійкість до бурої плямистості та кореневої гнилі. Залистяність - 48,7 - 53,2%. Ранньостиглий - від весняного відростання до дозрівання насіння 116 - 120 днів. Добре відростає навесні та після укусів.

Костриця овеча

® 06331001 Ноні

Заявник: Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Власник(и): Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Підтримувач(і):

Тетраплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний. Листок темно-зелений, наліт відсутній. Час викидання суцвіття від пізнього до дуже пізнього. Прапорцевий листок (на 2-й рік; за викидання волоті) короткий. Стебло коротке.

За даними заявника сорт має високу посухостійкість, зимостійкість, декоративність.