

04012002 Максим

Заявник: Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиловнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний. Стрижені колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Солома середньої довжини - 90 см . Середньостиглий , вегетаційний період - 95 днів . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 - 5 млн / га насіння . Залізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до недобору врожаю до 7,5 ц / га . На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай - 44,4 ц / га , що на 6,1 ц / га більше стандартів . Сорт має комплексну стійкість до більшості поширеніх в Україні хвороб : летючої , кам"яної та чорної сажок , борошнистої роси . Посухостійкий , що дає можливість формувати пивоварне зерно навіть в умовах нетривалої посухи . Рекомендований для поширення в зонах Степ , Лісостеп , Полісся .

04012010 Маурітія

Заявник: Лохов-Петкус ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – пізній. Соломина - слабовиловнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та середньої довжини. Стрижені колосу має короткий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – короткий.

Середньостиглий , дозріває за 99 днів . Особливістю сорту є те , що він відрізняється тікістю до весняних заморозків , високим температурям . Сорт інтенсивного типу . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 48,8 ц / га , що на 8 ц / га більше стандартів . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11 % ,екстрактивність речовин 80 % . Стійкий до ураження бурою іржею . Рекомендований для поширення у зоні Полісся .

04012026 Набат

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий

наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – короткий.

Стебло міцне , заввишки 56 - 72 см . Середньопізній , дозріває за 96 - 98 днів . Сорт напівінтенсивного типу . Стійкий до посухи , полягання та осипання . За даними заявитника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 - 4,5 млн / га насінин . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 ФФ . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай - 40,8 - 45,6 ц / га , що на 4,8 - 8,8 ц / га більше стандартів . Потенційна можливість сорту - 85 ц / га . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має - 10,3 -11,3 % , екстрактильність - 80 % . Стійкий до борошнистої роси , гельмінтоспоріозу . Рекомендований для поширення в зонах Степу та Лісостепу .

03012009 Партинер

Заявник: Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та сильний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають широкоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 66 см . Середньостиглий , вегетаційний період 93 дні . Насіння еліптично - видовжене . Маса 1000 насінин 48,1 г . В закладах експертизи отримали середній урожай 39,5 ц / га , що на 7,5 ц / га більше стандартів . За даними заявитника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Посухостійкий . Борошнистою росою , бурою іржею , гельмінтоспоріозом та летуючою сажкою уражується нижче стандартів . Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб . Рекомендований для поширення в зоні Степу .

04012022 Парнас

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.