

наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплює розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекиваюче охоплення соломини. Язичок – короткий.

Стебло міцне, заввишки 56 - 72 см. Середньопізній, дозріває за 96 - 98 днів. Сорт напівінтенсивного типу. Стійкий до посухи, полягання та осипання. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 - 4,5 млн / га насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 ФФ. За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай - 40,8 - 45,6 ц / га, що на 4,8 - 8,8 ц / га більше стандартів. Потенційна можливість сорту - 85 ц / га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має - 10,3 - 11,3 %, екстрактивність - 80 %. Стійкий до борошнистої роси, гельмінтоспориозу. Рекомендований для поширення в зонах Степу та Лісостепу.

03012009 Партнер

Заявник: Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та сильний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплює розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекиваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 66 см. Середньостиглий, вегетаційний період 93 дні. Насіння еліптично - видовжене. Маса 1000 насінин 48,1 г. В закладах експертизи отримали середній урожай 39,5 ц / га, що на 7,5 ц / га більше стандартів. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин. Посухостійкий. Борошнистою росю, бурою іржею, гельмінтоспориозом та летючою сажкою уражується нижче стандартів. Протруєння насіння препаратом Вітавак 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб. Рекомендований для поширення в зоні Степу.

04012022 Парнас

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Куц напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплює розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекиваюче охоплення соломини. Язичок – середній.