

04012025 Серпанок

Заявник: Селянсько фермерське господарство " Родень 10"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, пірамідальної форми форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплює розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-ромбічна, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – довгий.

Середньопізній, вегетаційний період - 98 - 100 днів. Сорт напівінтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай - 49,8 - 50,1 ц / га, що на 9,3 - 11,5 ц / га більше стандартів. Потенційна можливість сорту - 105 ц / га. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,3%. Сстійкий до борошнистої роси, карликової іржі. Рекомендований для поширення в зоні для Полісся.

® 05012024 Себастьян

Заявник: Сейет Плантефоредлінг І/С

Власник(и): Сейет Плантефоредлінг І/С

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із сильним восковим нальотом, прямий, має два ряди, пірамідальної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплює розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 59 - 66 см. Середньостиглий, вегетаційний період 87 - 95 днів. Маса 1000 - насінин - 45 г. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин. Потенційна врожайність сорту 105 ц / га. Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною куцистістю та ранніми строками сівби. В закладах експертизи отримали середній урожай 50,1 - 51,2 ц / га, що на 10,4 - 11,8 ц / га більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7 - 11,5%, екстрактивних речовин 80 - 82%. Рекомендований для поширення у зонах Лісостеп та Полісся.