

формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня дуже сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,5 ц/га, гарантований приріст - 28,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 77%, білка - 9 %.

05004030 Амеліор

Заявник: **Маїсадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - вузька (від 6,1 до 8.0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 96,1 ц/га, гарантований приріст - 31,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 77%, білка - 9 %.

03004032 АДН 220 МВ

Заявник: **Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - середня (від 8,1 до 10,0см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 73,0 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004068 Аматус

Заявник: **КВС ЗААТ АГ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) -