

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,5 ц/га, гарантований приріст - 18,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 9 %.

04004095 Апостолівський 310 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма " Агроцентр"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 67,7 ц/га, Лісостепу - 85,7 ц/га, гарантований приріст відповідно 15,9 і 18,9 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-78 %. Вміст крохмалю 71-77%, білка 10 - 8 %.

04004087 Барвінок МВ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 73,6 ц/га, гарантований приріст - 8,7 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

05004095 Баксос

Заявник: Р2н