

Власник(i):

230

Підтримувач(i):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листковою пластинкою і стеблом - середній (26-50). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілок на волоті - мала (від 5 до 15 шт.), головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,4 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

06004043 Бігстар

Заявник:

Євраліс Семанс

Власник(i):

Підтримувач(i):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,0 ц/га, гарантований приріст - 24,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,7 %. Вміст крохмалю - 75,7 %, білка - 9,3 %.

06004026 Бюрлі

Заявник:

Кассад Семанс

Власник(i):

Підтримувач(i):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок

стрижня слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 84,9 ц/га, гарантований приріст - 20,0 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 72 %, білка - 9 %.

05004060 Борозенський 277 МВ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,6 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

05004060 Борозенський 277 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,6 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

04004086 Витязь МВ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до