

**Вид:** Баклажан *Solanum melongena* L.

**Заявка № 15093005 Назва сорту:** Моріс **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 647 2201

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.05.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180789**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Рослина: за висотою	низька	3
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	коротке	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
8	Стебло: опушення	сильне	7
9	Листкова пластинка: розмір	великий	7
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1
14	Квітка: розмір	великий	7
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	слабка	3
16	Плід: за довжиною	дуже довгий	9
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7
18	Плід: відношення довжина / діаметр	дуже велике	9
19	Плід: основна форма	булавоподібна	5
20	Плід: розмір рубця маточки	великий	7
21	Плід: верхівка	округла	3
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	відсутня або дуже мілка	1
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7
27	Плід: плямистість	відсутня	1
28	Плід: смугастість	відсутня	1
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: квітконіжка за довжиною	довга	7
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7
35	Плід: розмір чашечки	великий	7
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже слабка	1
38	Плід: шипуватість чашечки	слабка	3
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3
42	Час початку цвітіння	ранній	3
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 55. Період від сівби до початку достигання, днів – 115. Період плодоношення, днів – 40. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): попелиці (*Aphidinea*) – 5. Стійкість проти хвороб, бал (1–9): вірусні хвороби (*Pseudomonas solanacearum* (Sm.) Berg.; *Fusarium* sp.; *Verticillium albo-atrum* Reincke et Berthold) – 7; гнилі (*Phomopsis vexans* Hart.; *Botrytis cinerea* Pers.; *Sclerotium Rolfsii* Sacc.), макроспоріоз (*Macrosporium solani* Ell. et Mart.) – 4; фітофтороз (*Phytophthora infestans* D.B.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.