

151 до 200 см). Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формує конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,5 ц/га, гарантований приріст - 26,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75,8 %, білка - 8,7 %.

05004100 Жаззі

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластиинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формує конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,0 ц/га, гарантований приріст - 24,1 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004086 Зомба

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластиинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластина листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формує конусно-циліндричний, за довжиною - середній (15-18). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 82,8 ц/га, гарантований приріст - 17,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 71 %, білка - 9 %.

05004034 Краснодарський 291 АМВ

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластиинки в просторі

похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 92,0 ц/га, гарантований приріст - 27,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

05004072 КВС Амбер

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,8 ц/га, гарантований приріст - 24,0 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004033 Краснодарський 194 МВ

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскових лусок волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі волоті) - помірна. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 57,8 ц/га, Лісостепу - 81,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 11,7 і 21,0 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9 балів, вилягання - 9 балів, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю 74 - 76%, білка 9 і 8 %.

Заявник: КВС ЗУУЛ АГ

05004088 КВС ЗУІ