

18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,5 ц/га, гарантований приріст - 23,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 73%, білка - 10 %.

04004107 Космо 230

Заявник: Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобєжиц"спулка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи -помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізуєть листок верхнього качана, см) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,8 ц/га, гарантований приріст - 15,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

05004061 Криничанський 257 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабок. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,1 ц/га, гарантований приріст - 24,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004109 Кадет

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 %