

Алича

® 06072002 Генерал

Заявник: Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

*Дерево сильноросле. Крона - помірно щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка - коротка. Вегетативна брунька дуже мала, конічної форми, притиснута до пагона. Листок спрямований догори. Листкова пластинка еліптичної форми, з гострим кінчиком, темно-зеленого забарвлення та помірно глянцевата з верхнього боку. З нижнього боку - слабко опушена. Край листкової пластинки - городчастий. Черешок листка довгий. Опушення верхньої сторони відсутнє або дуже слабке. Борізда - глибока. Залозки розміщені на основі листка й на черешку. Плодоніжка - довга. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квіток з повними пелюстками дуже багато. Квітка середнього розміру. Пелюстки - доторкуються. Чашолисток - широкоовальний. Пелюстка середнього розміру, округла, слабко хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована вище пиляків.

Плід дуже великий, продовгуватий, нерівнобокий. Верхівка - плескаті. Лійка - глибока. Основне покривне забарвлення плоду фіолетово-синє. М'якоть помаранчевого забарвлення, щільна, помірно соковита. Кісточка приросла до м'якоті. Кісточка середнього розміру, округло-еліптична в профіль. Вид кісточки зі шва - плескатий, з основи - видовжено-еліптичний. У профіль - не симетрична, зі шва - симетрична. Поверхня кісточки зерниста. Краї спинних швів - переривчасті. Черевний шов - вузький. Основа кісточки - широка й тупа. Верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк достигання - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 300,0 ц/га, середній урожай з дерева - 45,0 кг, середня маса плоду - 45 г, максимальна - 61 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 9 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою

мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,7%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 9 балів. Сорт середньопізнього строку достигання.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявників.

® 06072001 Тетяна

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявники - Інститут садівництва УААН, Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН.

*Дерево сильноросле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Плодушка kortka. Вегетативна брунька, мала, овальна, притиснута до пагона. Листок розміщений горизонтально стосовно пагона. Листкова пластинка широкоовальна, з гострим кінчиком, помірного зеленого забарвлення. З верхнього боку - помірно глянцевата, з нижнього - слабко опушена. Край листкової пластинки городчастий. Черешок середньої довжини. Опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабке. Борізда - середньої глибини. Залозки розміщені на основі листка й на черешку. Плодоніжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квітка мала, пелюстки віночка доторкуються. Чашолисток - широкоовальний. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, слабко хвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, нерівнобокий. Верхівка - плескаті. Лійка - глибока. Основне покривне забарвлення плоду помаранчево-жовте. М'якоть жовта, щільна, помірно