

Алича

® 06072002 Генерал

Заявник: Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

*Дерево сильноросле. Крона - помірно щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка - коротка. Вегетативна брунька дуже мала, конічної форми, притиснута до пагона. Листок спрямований догори. Листкова пластинка еліптичної форми, з гострим кінчиком, темно-зеленого забарвлення та помірно глянцева з верхнього боку. З нижнього боку - слабо опушена. Край листової пластинки - городчастий. Черешок листка довгий. Опушення верхньої сторони відсутнє або дуже слабке. Боріздка - глибока. Залозки розміщені на основі листка й на черешку. Плодоніжка - довга. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квіток з повними пелюстками дуже багато. Квітка середнього розміру. Пелюстки - доторкуються. Чашолисток - широкоовальний. Пелюстка середнього розміру, округла, слабо хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід дуже великий, продовгуватий, нерівнобокий. Верхівка - плеската. Лійка - глибока. Основне покривне забарвлення плоду фіолетово-синє. М'якоть помаранчевого забарвлення, щільна, помірно соковита. Кісточка приросла до м'якоті. Кісточка середнього розміру, округло-еліптична в профіль. Вид кісточки зі шва - плескатий, з основи - видовжено-еліптичний. У профіль - не симетрична, зі шва - симетрична. Поверхня кісточки зерниста. Краї спинних швів - переривчасті. Черевний шов - вузький. Основа кісточки - широка й тупа. Верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк досягання - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 300,0 ц/га, середній урожай з дерева - 45,0 кг, середня маса плоду - 45 г, максимальна - 61 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 9 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,7%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 9 балів. Сорт середньопізнього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявників.

® 06072001 Тетяна

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук
Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявники - Інститут садівництва УААН, Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН.

*Дерево сильноросле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Плодушка коротка. Вегетативна брунька, мала, овальна, притиснута до пагона. Листок розміщений горизонтально стосовно пагона. Листкова пластинка широкоовальна, з гострим кінчиком, помірного зеленого забарвлення. З верхнього боку - помірно глянцева, з нижнього - слабо опушена. Край листової пластинки городчастий. Черешок середньої довжини. Опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабке. Боріздка - середньої глибини. Залозки розміщені на основі листка й на черешку. Плодоніжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квітка мала, пелюстки віночка доторкуються. Чашолисток - широкоовальний. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, слабо хвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, нерівнобокий. Верхівка - плеската, лійка - глибока. Основне покривне забарвлення плоду помаранчево-жовте. М'якоть жовта, щільна, помірно

соковита. Кісточка середнього розміру, приросла до м'якоті. У профіль - округло-еліптична, зі шва - плеската. Поверхня кісточки - дрібно-зерниста. Краї спинних швів суцільні. Черевний шов - вузький. Основа кісточки вузька й тупа, верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк досягання - пізній.
* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 234,0 ц/га, середній урожай з дерева - 56,0 кг, середня маса плоду - 41 г, максимальна - 52 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,0%, вітаміну С - 5,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізннього строку досягання.

Напряв використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявників.

Черешня

® 04085003 Аншлаг

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька. Інтенсивність зеленого забарвлення з верхнього боку - сильна. Черешок листка довгий, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескати. Шкірка темно-червоного забарвлення, сочевичок - середня кількість. Сік - пурпуровий, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 48,0 кг, середня маса плоду - 12,6 г, максимальна - 15,3 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів і транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напряв використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085005 Віха

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Завник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони піднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька, з верхнього боку - темно-зелена. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки віночка широко-еліптичної форми, не доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескати. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік та