

соковита. Кісточка середнього розміру, приросла до м'якоті. У профіль - округло-еліптична, зі шва - плеската. Поверхня кісточки - дрібно-зерниста. Краї спинних швів суцільні. Черевний шов - вузький. Основа кісточки вузька й тупа, верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк досягання - пізній.  
\* Дані заявників.

\*За даними заявників: середня врожайність - 234,0 ц/га, середній урожай з дерева - 56,0 кг, середня маса плоду - 41 г, максимальна - 52 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,0%, вітаміну С - 5,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявників.

## Черешня

### ® 04085003 Аншлаг

**Заявник:** Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Заявник - Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька. Інтенсивність зеленого забарвлення з верхнього боку - сильна. Черешок листка довгий, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескати. Шкірка темно-червоного забарвлення, сочевичок - середня кількість. Сік - пурпуровий, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 48,0 кг, середня маса плоду - 12,6 г, максимальна - 15,3 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів і транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

### 02085005 Віха

**Заявник:** Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Заявник - Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони піднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька, з верхнього боку - темно-зелена. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки віночка широко-еліптичної форми, не доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескати. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік та