

соковита. Кісточка середнього розміру, приросла до м'якоті. У профіль - округло-еліптична, зі шва - плеската. Поверхня кісточки - дрібно-зерниста. Краї спинних швів суцільні. Черевний шов - вузький. Основа кісточки вузька й тупа, верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк досягання - пізній.
* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 234,0 ц/га, середній урожай з дерева - 56,0 кг, середня маса плоду - 41 г, максимальна - 52 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,0%, вітаміну С - 5,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявників.

Черешня

® 04085003 Аншлаг

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька. Інтенсивність зеленого забарвлення з верхнього боку - сильна. Черешок листка довгий, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескати. Шкірка темно-червоного забарвлення, сочевичок - середня кількість. Сік - пурпуровий, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 48,0 кг, середня маса плоду - 12,6 г, максимальна - 15,3 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів і транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085005 Віха

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони піднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька, з верхнього боку - темно-зелена. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки віночка широко-еліптичної форми, не доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескати. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік та

м'якоть червоного кольору. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - ранній.
* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 114,8 ц/га, середній урожай з дерева - 56,3 ц, середня маса плоду - 9,5 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокмікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею та кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 9,5%, вітаміну С - 5,3 мг%. Дегустаційна оцінка й транспортабельність - 8 балів. Строк досягання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085002 Визнання

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильросле. Середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона від слабкого до помірного. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, світло-зеленого кольору з верхнього боку. Черешок - середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка середня, пелюстки віночка - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Забарвлення шкірки плоду жовте, сочевичок - мало. Сік - безбарвний, м'якоть - кремово-біла, середньої пружності. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - ранній. Час досягання плодів - дуже ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 102,3 ц/га, середній урожай з дерева - 50,1 кг, середня маса плоду - 6,0 г, максимальна - 8,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: кісточковою мухою й попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 10,0%, вітаміну С - 4,5 мг%. Дегустаційна оцінка - 8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк досягання - ранній.

Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085004 Дебют

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зелена з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки широко-еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду - плескате. Забарвлення шкірки темно-червоне, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - червона, пружна. Кислотність плоду низька, вміст цукрів - високий. Плід середньо соковитий. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює її від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - пізній. Час