

05004017 Оріоль

252

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за довжиною - короткий. Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня слабка.

Урожайність по зоні Степу 57,2 ц/га, Лісостепу - 86,4ц/га, Полісся - 89,1ц/га, гарантований приріст відповідно 11,1; 25,8; 22,6 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9; 9 балів, вилягання 8; 9; 9 балів, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81; 80; 80 %. Вміст крохмалю 73 - 76%, білка 10; 8; 9 %.

05004056 Орільський 357 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,0 ц/га, гарантований приріст - 23,2 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

06004038 Орлик 330 МВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до

10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 52,0 ц/га, Лісостепу - 86,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 1,5 і 19,7 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 і 78 %. Вміст крохмалю 78-79%, білка 9 - 8 %.

06004039 Переяславський 230 СВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 53,7 ц/га, Лісостепу - 78,5 ц/га, Полісся - 89,3 ц/га, гарантований приріст відповідно 3,5; 13,6; 13,6 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9; 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 76-79 %. Вміст крохмалю 73-76%, білка 8 - 10 %.

06004031 ПВ 81-01

Заявник: Сейбр ТОВ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,4 ц/га, гарантований приріст - 23,5 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 8 %.

05004047 Подих МВ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):