

достигання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 108,3 ц/га, середній урожай з дерева - 48,8 кг, середня маса плоду - 8,5 г, максимальна - 10,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 12,1%, вміст вітаміну С - 5,9 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

® 04085001 Дивна

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку сильна. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - загострене. Шкірка - темно-червоного забарвлення, сочевичок середня кількість. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 46,0 кг, середня маса плоду - 11,7 г, максимальна - 14,4 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 9,8%, вітаміну С - 7,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк достигання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

89085002 Епос

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зеленого кольору з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка - середня. Пелюстки - широко-еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду плескاته. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плід від плодоніжки. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - середньопізній.