

достигання плодів - пізній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 108,3 ц/га, середній урожай з дерева - 48,8 кг, середня маса плоду - 8,5 г, максимальна - 10,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 12,1%, вміст вітаміну С - 5,9 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

\* Дані заявника.

### ® 04085001 Дивна

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку сильна. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - загострене. Шкірка - темно-червоного забарвлення, сочевичок середня кількість. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - пізній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 46,0 кг, середня маса плоду - 11,7 г, максимальна - 14,4 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 9,8%, вітаміну С - 7,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк достигання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

### 89085002 Епос

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зеленого кольору з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка - середня. Пелюстки - широко-еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду плескاته. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плід від плодоніжки. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - середньопізній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 149,8 ц/га, середній урожай з дерева - 73,8 кг, середня маса плоду - 9,0 г, максимальна - 12,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 14,0%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

\* Дані заявника.

## **89085003 Ера**

**Заявник:** Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка - довга, вузька, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-чепвно забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід - великий, округлий. Закінчення лійки - плескате. Шкірка плоду темно-червоного кольору, сочевичок тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала. Округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - ранній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 160,0 ц/га, середній урожай з дерева - 78,8 кг, середня маса плоду 10,5 г, максимальна маса - 14,5 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,8 мг%. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - ранній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

## **® 06085002 Любава**

**Заявник:** Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук  
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

\*Дерево помірної сили росту, сильно розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні - середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабе. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок - довгий, наявні оранжево-жовтого забарвлення залозки. Віночок квітки великий. Пелюстки округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Лійка - заглиблена. Забарвлення шкірки - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. На шкірці - середня кількість малих сочевичок. Сік - безбарвний, м'якоть - жовта. Плід середньої пружності, дуже соковитий, помірно кислий, вміст цукрів - високий. Плодоніжка - середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична. Час цвітіння - пізній. Час досягання - пізній.