

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 149,8 ц/га, середній урожай з дерева - 73,8 кг, середня маса плоду - 9,0 г, максимальна - 12,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокоміозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мугою - 1 бал. Вміст загального цукру - 14,0%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Срок досягнання - середній.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.  
\* Дані заявника.

### 89085003 Ера

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівлінісена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка - довга, вузька, темно-зеленої забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-чевено забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід - великий, округлий. Закінчення лійки - плескате. Шкірка плоду темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік і м'якоть - червоні. М'якоть - пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала. Округла. Час цвітіння - середній. Час досягнання плодів - ранній.

\*Дані заявника: середня врожайність - 160,0 ц/га, середній урожай з дерева - 78,8 кг, середня маса плоду 10,5 г, максимальна маса - 14,5 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокоміозом - 1 бал, моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мугою - 3 бали. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,8 мг%. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Срок досягнання - ранній.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

### ® 06085002 Любава

Заявник: Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук  
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

\*Дерево помірної сили росту, сильно розгалужене. Крони - напівлінісена. На однорічному пагоні - середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок - довгий, наявні оранжево-жовтого забарвлення залозки. Віночок квітки великий. Пелюстки округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Лійка - заглиблена. Забарвлення шкірки - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. На шкірці - середня кількість малих сочевичок. Сік - безбарвний, м'якоть - жовта. Плід серенької пружності, дуже соковитий, помірно кислий, вміст цукрів - високий. Плодоніжка - середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична. Час цвітіння - пізній. Час досягнання - пізній.