

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 197,0 ц/га, середній урожай з дерева - 35,5 кг, середня маса плоду - 8,4 г, максимальна - 12,5. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 13,0%, вітаміну С - 3,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,7 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізнього строку достигання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06085002 Любава

Заявник: **Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук**

Власник(и): **Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук**

Підтримувач(і):

Заявники - **Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.**

*Дерево помірної сили росту, сильно розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні - середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок - довгий, наявні оранжево-жовтого забарвлення залозки. Віночок квітки великий. Пелюстки округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Лійка - заглиблена. Забарвлення шкірки - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. На шкірці - середня кількість малих сочевичок. Сік - безбарвний, м'якоть - жовта. Плід середньої пружності, дуже соковитий, помірно кислий, вміст цукрів - високий. Плодоніжка - середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична. Час цвітіння - пізній. Час достигання - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 197,0 ц/га, середній урожай з дерева - 35,5 кг, середня маса плоду - 8,4 г, максимальна - 12,5 г. Зимостійкість та посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею та кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 13,0%, вітаміну с - 3,2%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,7 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізнього строку достигання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявників.

® 06085001 Легенда Мліїва

Заявник: **Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и): **Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук**

Підтримувач(і):

Заявник - **Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.**

*Дерево - помірної сили росту, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. Сочевичок на однорічному пагоні мало. Вегетативні бруньки - злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок листка середньої довжини. Наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка - велика. Пелюстки - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід - дуже великий, ниркоподібний. Закінчення лійки - плескате. Забарвлення шкірки плоду - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. Сочевичок на шкірці - мало. Сік - безбарвний, м'якоть жовта, пружна, кислотність - низька. Вміст цукрів - середній, соковитість - висока. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округлої форми. Час цвітіння - ранній. Час